

Ludwig, Christian Friedrich,

Erste Aufzählung der bis jetzt in Sachsen entdeckten Insekten

Leipzig 1799

Zool. 339

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10308117-1

VD18 11548584

Zool.

339

<36606948900015



<36606948900015

Bayer. Staatsbibliothek

Zool. 339

Zool.

339.

Erste Aufzählung

der

bis jetzt in Sachsen entdeckten

I n s e k t e n.

Im Namen

der Linneischen Societät

herausgegeben

v o n

D. Christian Friedrich Ludwig

Prof. zu Leipzig.

L e i p z i g

in Commission bey Christian Gottlieb Rabenhorst.

1 7 9 9.

THE AMERICAN

185

has been in the hands of the

of the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

An
Sachsens Naturbeschreiber
und
Naturgeschichtsforscher.

Wem könnte ich wohl mit mehrerem Rechte diese erste Aufzählung Sächsischer Insekten zuschreiben, als denenjenigen meiner Landsleute, die mich und die Linneische Societät zu dieser Arbeit unterstützt oder die Naturkörper Sachsens auch aus den übrigen Klassen und Reichen mit Aufmerksamkeit untersucht haben. Einem Theile meiner Landsleute bin ich also den vollkommensten Dank für ihre Unterstützung schuldig, und einen andern Theil derselben habe ich zu künftigen Untersuchungen aufzufordern. Denn schön wäre es allerdings, wenn noch mehrere sich der Naturbeschreibung und Naturforschung in Sachsen annehmen wollten, als bis jetzt es gethan haben. Ich und die Linneische Societät möchten daher unsern naturforschenden Landsleuten gerne einen Vereinigungspunkt und Sammelplatz anbieten, dem sie ihre Bemerkungen und Beobachtungen anvertrauen und mittheilen könnten. Und ich, der ich auf hiesiger Universität die schöne Gelegenheit habe, mehrere meiner jungen fleissigen Landsleute kennen zu lernen

*

Bayerische
Staatsbibliothek
München

und der ich von Zeit zu Zeit die sächsische Naturgeschichte nach allen drey Reichen in öffentlichen Vorlesungen vorzutragen pflege, hege schon seit mehreren Jahren den heißen Wunsch, diese Gelehrsamkeit für mein Vaterland so viel, als in meinen Kräften steht in den folgenden Jahren auszuarbeiten. Allein einmal bey dem weiten Umfange meines Vaterlandes und zweytens bey den bis jetzt noch so sparsamen Quellen und Hülfsmitteln würde mir dieß ohne Unterstützung zu leisten ohnmöglich seyn. Selbst meine *Initia Faunae Saxonicae* heraus zu geben muß ich vor der Hand noch Anstand nehmen. Diese Aufzählung einer der zahlreichsten Klassen soll ein bloßer Vorläufer der *Initiorum* seyn, der zu fernern Berichtigungen und Verbesserungen in Betreff einer Fauna die beste Veranlassung geben kann; soll vor der Hand bloß ein Verzeichniß für die Entomologen bey ihren Spaziergängen und Sammlungen abgeben: denn was zu einer ausführlichen Fauna entomologica gehört, werde ich sogleich anzugeben bemüht seyn.

Die ganze Naturbeschreibung Sachsens anlangend glaube ich behaupten zu können, daß die Fossilien-schätze meines Vaterlandes am meisten und ausführlichsten untersucht sind. Nicht eben das nehmliche gilt von den Pflanzen. — Jedoch von *Oryctographien* und Floren will ich jetzt nicht sprechen. — Das Thierreich ist bey weiten am wenigsten untersucht.

Daß so wenige Länder und so wenige Provinzen Deutschlands und ihre Universitäten keine Faunen haben, könnte allerdings Wunder erregen, allein anderntheils wird es auch erklärlich, wenn man die Schwierigkeiten bedenkt, welche wegen der Menge der zu entdeckenden Geschöpfe theils, theils ihres Aufenthalts wegen mit diesem weitläufigen Studium

verbunden sind. In Betreff der Thiere scheint der nördliche Theil Europens allerdings mehr noch, als der südliche untersucht zu seyn. Deutschland aber könnte der Anzahl und der Gelehrsamkeit seiner Naturforscher nach am ersten schon eine Fauna haben.

In Sachsen sind Thüringens Vögel mit Sorgfalt nicht nur gezählt, sondern von ihrer Naturgeschichte ist zum Theil auch schon viel erzählt; von den Fischen und Amphibien ist wenig angegeben; in Betreff der Insekten sind die Gegenden um Dresden und um Leipzig schon längst in etwas untersucht und in Thüringen hat man für die Naturbeschreibung der Würmer in einigen Ordnungen zu arbeiten angefangen. In Sachsen zähle ich bis jetzt ohngefähr 58 bis 60 Mammalien; 223 bis 230 Vögel; 14 bis 20 Amphibien; 31 bis 44 Fische; 2318 bis 3000 Insekten; (— unter welchen 1043 Käfer — 25 Heuschrecken — 37 Florfliegen — 277 Wespen — 11 Wasserjungfern — 10 Skolopendern — 22 Spinnen — 8 Krebse — 555 Schmetterlinge — 120 Wanzen und 210 Fliegen) und 274 bis 300 Würmer: im Ganzen also 2918 bis 3654 Thiere. Rechne ich nun muthmaasslich und demnach, was in einigen Klassen und Ordnungen zeither geleistet worden, was den vorhandenen Pflanzen nach noch zu hoffen ist; ferner den neuen Arten zufolge, die in den verschiedenen Klassen Sachsen noch aufzuweisen haben dürfte weiter, so kann ich wohl mit Grund annehmen, daß es 5 bis 6000 Thiere, wo nicht mehrere haben dürfte. Denn selbst in diesen Tagen sind mir schon wieder viele Insekten mehr bekannt geworden, die sich in Sachsen finden.

Was zur Abfassung einer Fauna überhaupt gehören dürfte, das werde ich zu einer andern Zeit zu erörtern mir angelegen seyn lassen: jetzt von

dem, was zu einer Fauna entomologica insbesondere gehört.

Ob nun schon eine jede Fauna nicht blos Naturbeschreibung, sondern auch vorzüglich Naturgeschichte, um den praktischen Wissenschaften nützlich zu werden, enthalten muß, so soll doch jene dieser allezeit vorhergehen.

Also muß die Aufzählung der wirklich entdeckten Arten und die Berichtigung der Nomenclatur allezeit den Anfang machen. Hierher gehört also vornehmlich Vollständigkeit und Sichtung der Provincialbenennungen: um welche ich daher meine Landsleute auch für die übrigen Thierklassen gebeten haben wollte. Denn es ergiebt sich von selbst, daß bey dem praktischen Bearbeiter unsers Fachs die Kenntniß mit von der zuverlässigen Bestimmung des Naturkörpers in der Art und seines Namens ihren Anfang nehmen müsse.

Eine so viel als möglich leichte und faßliche und wo es geschehen kann natürliche Systematik muß zum Grunde liegen. Denn wenn es auf die Anwendung der Naturkörper ankommt, so kann mit einer schwer erkünstelten Methode nichts ausgerichtet werden. Ich habe daher auch hier den Ordnungen faßliche und verständliche Benennungen gegeben, um den gemeinern Bearbeitern der vaterländischen Naturbeschreibung gefällig zu seyn. Auch hätte ich die Ordnungen selbst in eine andere Reihe gestellt, wenn anders die entomologische Systematik schon mehr dazu geeignet wäre.

Drittens ist zur Abfassung einer Insektenfauna die Sichtung der Varietäten von großer Nothwendigkeit. Der Sexus nemlich giebt zu mancherley Irrthümern Anlaß und Insekten, die nur dem Sexus nach von einander unterschieden sind, werden bald

für besondere Species, bald für Varietäten gehalten. Auch könnten bey der großen Assimilität der Arten jezuweilen in dieser Klasse natürliche Bastarde wohl vorkommen. Ferner erzeugt die Verschiedenheit des Orts, seiner Kultur und die davon abhängende Fütterung der Insekten mancherley Spielarten in Gröfse, Kolorit, Bekleidung u. s. w., welche insgemein entdeckt werden können. Auch die Witterung und die dadurch beschleunigte oder verspätete Ausbildung dieser Geschöpfe nimmt in Ansehung der Veränderung der äufsern Kennzeichen an der Entstehung mancherley Varietäten Antheil.

In eine solche Fauna gehört ferner eine vollständige aneinanderhängende Naturgeschichte jedes Insekts — eine ausführliche Schilderung seiner Metamorphose — Angabe der Verwandlungszeiten und unter welchen mitwirkenden Umständen die Verwandlung und vorzüglich die Vermehrung durch Eyerlegen und durch Larven sich ergiebt — sein Aufenthalt nach den verschiedenen Verwandlungsperioden — sein gewöhnliches oder aus Noth gewähltes Futter — seine Begattung — seine Nützlichkeit und Schädlichkeit — u. s. w.

Aufenthalt und Verbreitung der Insekten sind — besonders in den verschiedenen Verwandlungsperioden — ein Paar wichtige Momente ihrer Geschichte, welche auch mit der Beurtheilung ihrer Schädlichkeit in genauer Verbindung stehen. Hier liegen noch viele Geheimnisse unsern Augen verborgen, deren Entdeckung dem Landwirth und dem Hauswirth von großer Erheblichkeit seyn würde. Die Turba insectorum ist ja ein Mundus invisibilis, welcher überall seine Stelle, sein Plätzgen findet. Der entomologische Faunist muß seine Gegenden daher wohl kennen, und sorgfältig aus-

spüren, auf die Veränderungen und Katastrophen seiner Gegend ein aufmerksames Auge richten, und darf im Beobachten, im sorgfältigen Beobachten nicht ermüden. Woraus auch der Nutzen der naturhistorischen Topographien sich überhaupt ergibt. Dafs ich unter naturhistorischer Topographie hier etwas anders verstehe, als unter Flora, Fauna, bedarf keiner weitläufigen Erklärung. Hier lassen sich der selbst unvermutheten Erscheinungen und Erfahrungen noch recht viele erwarten. Bis jetzt aber freylich sind fast alle Faunen, selbst die besten, blofse Namenverzeichnisse gewesen, blos für die Naturbeschreibung hat man sorgen können, noch nicht für die Naturgeschichte.

Ein anderes wichtiges Moment, das hier nothwendig angegeben werden mufs, ist die Verbindung der Entomologie mit der Botanik. Freylich sollten die Entomologen öfterer als gewöhnlich gute Botaniker und diese wiederum gute Entomologen seyn. Es fehlt ja hier ganz und gar nicht an einem Beispiele, welches der grofse Schwedische Naturforscher gegeben hat. Offenbar richten sich die Insektenwanderungen nach den Pflanzenzügen, und die botanische Geographie ist zu der Ausarbeitung der entomologischen Faunen unumgänglich nothwendig. Zwar nicht immer, doch sehr oft sind die Trivialnamen der Insekten von Pflanzen hergenommen, sehr gut, und verdienen fleissigere Nachahmung.

Auch mufs ich nothwendig noch der meteorologischen Entomologie gedenken. Wenn nemlich, damit ich deutlicher werde, der Entomolog auf die Verwandlung und die Erscheinung der Insekten und auf die Zeit ihrer Erscheinung in Beziehung auf Witterung, Erscheinung derselben in gröfserer oder geringerer Menge Achtung geben wollte, und

schon Jahrhunderte lang darauf geachtet hätte, würde er andere erhebliche Naturerscheinungen, die zukünftige Witterung anlangend, voraus anzuzeigen in Stand gesetzt werden. So wie es auch eine meteorologische Botanik giebt, auf deren Ergründung ich sehr viel rechne, weil ihre Nützlichkeit jedem Landwirth gar bald einleuchtet, und wir einige Fragmente davon schon besitzen.

Neue Species sind vor der Hand noch ganz und gar nicht in dieser Aufzählung angegeben, weil ohne Beschreibung und Abbildungen, die der Kosten wegen die Linneische Societät jetzt übergehen mußte, ihre bloße Angabe ohne Nutzen geblieben seyn würde. So viel kann ich aber im Voraus sagen, daß Sachsen wohl mehrere Hundert neue Insekten, — ich meine neue Species — wo nicht noch mehr dürfte in der Zukunft aufzuweisen haben. Denn bedenkt man, wie viel neue Entdeckungen die Ordnung der Käfer dargeboten hat, so kann man, wenn die übrigen Ordnungen ähnlichen Zuwachs erhalten sollten, mit Recht annehmen, daß die Insektenfauna Sachsens, auch selbst noch ohne neue Species, sehr anwachsen dürfte. Und aus diesem Grunde wird man überhaupt bey dem so regen Eifer der jetzigen Entomologen, besonders bey einer sorgfältigen Abfassung einer Fauna, langsam zu Werke gehen müssen.

Jetzt sind noch einige kurze Anmerkungen übrig. Nach Fabriz System von 1792. habe ich mich besonders gerichtet, und was ich unter den Neuern verstehe, wird denen gar bald bekannt werden, die mit mir die Entomologie studieren. F. S. deutet auf das neueste Supplement von Fabriz vom vorigen Jahre und alle in der Hallischen Gegend von dem

sehr fleissigen und geschickten Entomologen, Hrn. Hübner, gefundene Insekten sind mit einem † bezeichnet, ihre Anzahl ist in der That nicht gering.

Schlüsslich fordere ich meine werthgeschätzten Landsleute nochmals auf, mir und der Linneischen Societät für diese Thierklasse, so wie für die übrigen Beyträge zu übermachen. Keinem Entdecker soll sein Ruhm entzogen werden, sondern sein Name soll in den Annalen der Sächsischen Fauna ehrenvoll aufbewahrt werden. Und sollte es denn nicht Pflicht und Vergnügen seyn, zur Kenntniss des Vaterlands etwas beygetragen zu haben. Ja ich rechne mit der süssesten Hoffnung auf recht viele und nützliche Beyträge. Leipzig im Jenner 1799.

Dr. Christian Friedrich Ludwig.

Erste Ordnung.

SCARABAEI Käfer,

(Coleoptera L. Eleutherata F.)

SCARABAEVS * scutel-	SCAR. * Fossor.
(Dungkäfer) lati thora-	* foetens † (Freyb.)
ce cornuto.	Hr. Toussaint von
	Charpentier.
Typhoeus (Dresden,	* scybalarius.
Torgau, Düben.)	* terrestris.
nasicornis (Oryctes	* Porcus. †
Illig.) ¹⁾	bimaculatus (im Mans-
mobilicornis (Dresden,	feldischen) Hr. M.
Freyberg, Leipzig.)	Schwägrichen.
** scutellati thorace in-	* fimetarius.
ermi capite cornuto.	* erraticus.
* subterraneus.	

¹⁾ von ὀρύκτης.

SCAR. * conspurcatus.	SCAR. * scrofa †
* inquinatus.	* merdarius.
* sordidus.	quisquilius.
luridus.	* Pecari. Hr. v. Char-
* granarius. (O. Lau-	pentier.
sitz, Leipzig.) Hr.	* porcatus.
Pr. Leske, Hr. Eber-	* asper. (Dresd.)
hardt.	* foetidus. (Leipzig,
* haemorrhoidalis.	Frbg.) ²)
*** scutellati mutici	**** Exscutellati tho-
capite thoraceque	race cornuto.
inermi.	
stercorarius.	** lunaris.
sylvaticus. P. (Leipz.	emarginatus. Hr. von
Frbg.)	Charp.
vernalis.	Lemur. (Leipz.) Hr.
* rufipes.	Pr. Leske.
* 4 maculatus.	** Camelus.
4 pustulatus † (Wit-	***** Exscutellati tho-
tenberg) Herr M.	race inermi ca-
Schwägrichen.	pite cornuto.
plagiatus. H. Zschacke	** Taurus.
* testudinarius. Hr.	** Vacca.
M. Schwägr.	

2) Alle mit einem * bezeichneten Species gehören zum neuen Genus *APHODIUS* von *Ἀφῳδος*.

SCAR. ** medius. der	HISTER. semipunctatus.
Neuern, Hr. M. Schwägrichen.	Hr. v. Charp. Hr. M. Schwägr.
Capra. †	12 striatus d. Neuern.
** Coenobita (Dresd. Leipz.)	pygmaeus.
** muchicornis.	sulcatus. (Dresd.) Hr. v. Charpentier.
Xiphias. † (Frbg.)	sinuatus.
** nutans.	purpurascens. der N. (Dresd.)
verticicornis. (Dresd.) Hr. Eberhardt.	2 maculatus (Dresden Leipzig.)
***** Exscutellati mutici.	4 maculatus. (Dresden Leipzig.)
Schaefferi (Dresd. Hubertsburg.) Hr. Eberhardt.	aeneus.
squalidus. (Leipz.) Hr. Zschacke.	detritus. H. Zschacke.
flauipes. (Duben.)	flauicornis d. Neuern.
** Schreberi. †	depressus der Neuern.
** ovatus. 3)	SPHAERIDIUM scarabae- (Kugelkäfer) oides.
HISTER. vnicolor.	lunatum (Dresd. Frbg. Leipzig.)
(Stutzkäfer) glabratus.	2 pustulatum.

3) Alle mit ** bezeichneten Species gehören zum Genus COPRIS des Geoffroy von κόπρος.

SPHAER. marginatum † Trox sabulosus.	
melanocephalum.	arenarius. (Dresden,
haemorrhoidale.	Düben.)
unipunctatum (Dresd.)	OPATRUM sabulosum.
ruficolle. †	(Sandgräber) tibiale.
bicolor. †	agricola. † ⁵⁾
fimetarium. (Dresden,	SCARITES arenarius.
Leipzig.)	(Schlupfkäf.) gibbus.
seminulum. ⁴⁾	(Dresd. Frbg. Leipz.)
	gagates. (Dresd. Frbg.)
BYRRHVS. Gigas?	piceus.
(Fugenkäf.) pilula.	PIMELIA leucogra-
fasciatus. (Dresden,	(Höckerkäf.) pha. †
Leipzig.)	BLAPS Gages
ater.	(Todtenkäf.) (Leipz.) Hr.
murinus. (Frbg.) Hr.	Eberhardt.
v. Charpentier.	mortisaga.
varius. Hr. Zschacke.	dermestoides. ⁶⁾
aeneus.	femoralis.
ornatus.	glabra.

4) Ein ANISOTOMA der Neuern (von ἀνισος und τεμνω. Hierher gehören auch die AGATHIDIA (ἀγαθίς) der Neuern.

5) Ein BOLITOPHAGVS der Neuern, von βωλίτης und φάγω.

6) Nach den Neuern ein Helops.

TENEBRIO	molitor.	CARAB.	coriaceus.
(Mehlkäfer.)			glabratus.
TROGOSITA	7) caraboi-		violaceus.
(Kneipkäf.)	des (Dresd.)		cyaneus. (Dresd.) (in-
ferruginea.			tricatus d. Neuern.)
HELOPS	lanipes.		gemmatus. (hortensis
(Schattenk.)	* serra-		d. N.) (Universitäts-
	tus. 8)		holz) Hr. Zschacke.
* barbatus.	†		hortensis. (nemoralis
* canaliculatus.	†		der Neuern.)
laevis.	†		concolor.
ater.			conuexus.
quisquilius.			auratus.
ruficollis.	†		auronitens. (Zeiz) Hr.
tristis. (Dresd.)	Hr.		Constantin.
Bar. v. Block.			morbillosus. Hr. M.
fuscus. (Dresd.)	Hr.		Schwägr.
Bar. v. Block.			granulatus. (cancel-
fasciatus. (Dresd.)	Hr.		latus der Neuern.)
Bar. v. Block.)			clathratus. Hr. Zsch.
CARABVS	* Thorace		nitens. (Schneeberg,
(Laufkäfer.)	cordato.		Freyberg.)

7) von τρωγω und σίτος.

8) Die drey mit * bezeichneten Arten sind SERRO-
PALPI der Neuern.

CARAB. leucophthalmus. (melanarius
der Neuern.)

planus. (Dresd.)

sabulosus. (Dresd.)

ruficornis.

fulvipes.

flavicornis.

piceus.

madidus.

crepitans.

sclopeta. (Hr. v. Charpentier.)

multipunctatus.

oblongo punctatus.

Dianae.

atricapillus.

** thorace postice angustato.

cephalotes.

*** thorace quadrato.

striola.

metallicus.

**** thorace rotundato
margine prominulo obtuso.

Sycophanta,
inquisitor.

breuicollis. (Plauen)
Hr. M. Schwägr.

punctulatus.

obscurus.

bicolor.

pilicornis. (O Lausitz,
Dresd. Leipz.)

holosericeus.

punctatulus. †

coerulescens.

lepidus. (Ob. Lausitz)
Hr. Pr. Leske.

cupreus.

vulgaris.

latus. (Mühlberg) Hr.
Eberhardt.

excavatus P.

anthracinus P. Hr.
M. Schwägr.

ouatus.

helopioides.

azureus.

fulvus Kugel.

CARAB. ferrugineus. *)	CARAB. meridianus.
pallens.	(Dresd.) Hr. Eber-
aeneus.	hardt.
nigricornis. Herr	4 maculatus.
Zschacke.	4 guttatus. Hr. Zsch.
6 punctatus.	vstulatus.
melanocephalus.	2 guttatus. Hr. Zsch.
cianocephalus.	testaceus.
crux maior.	truncatus.
haemorrhoidalis.	pygmaeus.
(Dresd. Bieniz bey	tristis.
Leipzig.)	truncatellus.
Andreae (Dresd.) Hr.	CYCHRVS rostratus.
Eberhardt.	(Deckkäfer.) (Dresd.)
bipustulatus. (Dresd.)	attenuatus. (Dresd.)
germanus. (Univers.	CICINDELA campestris,
Holz) Hr. Zschacke.	(Sandkäfer) hybrida.
velox.	sylvatica.
rufescens. (Mühlberg)	germanica.
Hr. Eberhardt.	biramosa. (Leipz.) Hr.
lunatus. (Dresd.) Hr.	Eberhardt.
v. Charp.	ELAPHRVS riparius.
prasinus.	(Strandkäf.) striatus.
vaporariorum.	

*) Ein Antiodontalgicum.

ELAPH. flauipes.

aquaticus.

semipunctatus. (*Dresden, Leipz. †*)

2 guttatus.

SCOLYTUS aeneus.

(*Sumpfkäf.*) (*Dresd.*)
Hr. v. Block.

limbatus.

HYDROPHILUS piceus.

(*Schwimmkäfer.*)

caraboides.

scarabaeoides.

orbicularis.

marginellus.

obscurus.

luridus.

minutus.

griseus. †

emarginatus. (*Hr. v. Charpentier.*)

DYTICUS latissimus.

(*Wasserkäf.*) (*Torgau, Dresd. Frbg.*)

marginalis.

punctulatus.

DYTICUS Roeselii. Hr.

v. Charpentier.

crasipes. Hr. Pr.
Leske.

sulcatus.

liuidus. Hr. Pr. Leske.

striatus.

cinereus.

zonatus *der Neuern.*

2 pustulatus.

2 punctatus.

Hybneri.

stagnalis.

transuersalis.

lacustris.

ater.

aeneus.

chalconotus.

} *der*
} *Neuern*

Hermanni. Herr
Zschacke.

vliginosus.

maculatus.

erythrocephalus.

varius. Hr. Zschacke.

notatus.

DYTICVS adpersus der GYRINVS bicolor.

Neuern.

6 pustulatus.

palustris.

ouatus.

oualis der Neuern.

picipes. Hr. v. Char-
pentier.

litturatus. Herr M.
Schwägr.

chrysomelinus. Hr.
v. Charpentier.

halensis.

granularis.

confluens.

obliquus.

impressus.

geminus. †

lineatus.

inaequalis.

minutus.

fuscus. } der
v-nistriatus. } Neuern.

crassicornis.

GYRINVS natator.
(Tauchkäfer)

ELOPHORVS aquaticus.

(Wasserrun- nubilus.

zelkäfer.) minutus.

Hr. Zschacke.

CLERVS mutillarius.

(Ameisenkäf.) formica-
rius.

4 maculatus.

apiarius.

alvearius. (Freyberg,
Leipzig.)

NOTOXVS violaceus?

(Schildkrö- mollis. (Cle-
tenkäfer.) rus mollis
d. Neuern.)

monocerus.

serricornis.

thoracicus. (Frbg.) Hr.
v. Charpentier.

calycinus. (Dresd.) Hr.
v. Block.

CANTHARIS fusca.

(Afterleucht- liuida.

käfer.) dispar.

CANTHAR. obscura. (Bie- MALACHIVS equestris.
nitz, OLausitz) Hr. (Freyberg.) Hr. v.
Pr. Leske. Charpentier.

lateralis. (Leipz.) Hr. flauipes. †
Eberhardt.

DERMESTES lardarius.
(Speckkäfer.) macella-
rius.

atra.

pellio.

pallida.

vndatus.

ruficollis.

20 guttatus. †

2 punctata.

bicolor.

fulvicollis.

vulpinus. Hr. M.

melanura.

Schwägrichen.

nigra.

minima. (Ob.Lausitz)

murinus.

Hr. Pr. Leske.

tesselatus. Hr. M.

testacea.

Schwägrichen.

2 guttata. (Leipzig,
Freyberg.)

violaceus.

sanguinicollis.

MALACHIVS aeneus.

fumatus.

(Warzen- pustula-
käfer.) tus.

tomentosus.

praeustus. †

picipes. †

pedicularius.

nigripes. †

pulicarius.

brachypterus.

fasciatus. (Dresden,
Leipzig.)

scanicus.

4 pustulatus. (Dresd.)

Hr. v. Block.

DERMESTES.	serra.	PTINVS	Latro.
	(Dresden.) ⁹⁾	denticornis.	(Dresd.)
* longicornis.		PTILINVS	pectinatus
* porcatus. ¹⁰⁾		(Feder-	(Dresd.) ¹¹⁾
ANOBIUM	striatum.	kammkäf.)	serratus. †
(Hauskäfer)	pertinax.	PARNVS	proliferi-
Boleti.		(Heuschrek-	cornis.
molle.		kenkäfer.)	(Freyberg)
tesselatum.	(Witten-		H. v. Charp.
	berg.)	acuminatus.	(Dresd.)
	Herr M.	NECROPHORVS	germa-
	Schwägrichen.	(Todtengrä-	nicus.
festium.	(Dresden.)	ber.)	humator.
	Hr. v. Block.		(Frbrg.) Hr. v.
Abietis.			Charpentier.)
PTINVS	germanus.	vespillo.	
(Bohrkäfer.)	(Dresd.)	mortuorum.	(Dresden,
	Hr. Eberhardt.	Leipzig.)	
longicornis.		SILPHA	littoralis.
Fur.		(Aaskäfer.)	liuida.
imperialis.	Herr		grossa. ¹²⁾
	Zschacke.		

9) Dorcatoma Dresdense und Anobium dorcatoma d. N.

10) Die zwey mit einem * bezeichneten Käfer gehören zum Genus Latridius d. N.

11) Anobium pectinatum d. N.

12) Peltis grossa d. N.

SILPHA thoracica.

rugosa.

atrata. (*Dresd. Leipz.*)

lunata.

laeuigata. (*Naumburg*)

Hr. M. Schwägr.

obscura. (*Dresd. Leipz.*)

reticulata. †

opaca.

sinuata.

4 punctata. (*Dresden*)

Hr. Eberhardt.

ferruginea.

oblonga. ¹²⁾

vndata.

NITIDVLA 2 pustulata

(*Glanzkäf.*) (*Dresden,*

Frbrg. Leipz.)

aestiva. .

obsoleta. (*Frbrg.*) Hr.

v. Charpentier.

ferruginea. (*Ob. Lau-*

sitz) H. P. Leske.

strigata. †

NITIDVLA varia.

Colon.

limbata. †

discoides. (*Freyberg,*

Leipzig.) Hr. v.

Charpent. Hr. M.

Schwägrichen.

pedicularia.

litura. † ¹³⁾

aenea. Hr. Zschacke.

rufipes. Hr. Zschacke.

punctatissima. (*Frbrg.*)

Hr. v. Charpent.

HETEROCERVUS margi-

(*Maulwurfsk.*) natus. †

ANTHRENVUS pimpinel-

(*Knollkäfer*) lae. (*Dres-*

den, Leipzig.)

scrophulariae.

Museorum.

verbasci. H. Zschacke.

COCCINELLA M. ni-

(*Marienkäfer.*) grum.

impunctata. (*Dresd.*)

¹²⁾ Peltis d. N.

¹³⁾ Coccinella Litura d. N.

Coccin. margine pun-	Coccin. 13 punctata.
ctata. †	14 maculata.
vnifasciata.	ocellata.
annulata.	16 } punctata.
2 punctata. ^{13b)}	18 }
hieroglyphica (Leipz.)	19 }
Hr. Eberhardt.	20 *) }
4 maculata. †	22 }
5 punctata.	24 }
5 maculata. †	conglomerata.
6 punctata.	14 punctata.
7 punctata. ^{13b)}	conglobata.
7 notata.	10 } guttata.
7 maculata.	12 }
8 punctata.	14 }
9 punctata.	16 }
10 punctata.	18 }
11 punctata.	20 }
12 punctata.	oblongoguttata (Dres-
dispar. (im Linkelschen	den.)
Holze) H. Zschacke.	impustulata.
13 maculata. (Leipz.)	paruula. Herr M.
Hr. Eberhardt.	Schwägrichen.
	analys.
	2 pustulata.

13 b) Insecta antiodontalgica.

*) C. viginti duo punctata d. N.

Coccin. variabilis.

frontalis †

4 pustulata.

6 pustulata.

lunata ?

10 pustulata.

12 pustulata.

14 pustulata.

pantherina.

tigrina.

CASSIDA viridis.

(Schildkäf.) equestris.

affinis.

vibex (Dresd. Leipz.)

Hr. Zschacke.

nebulosa.

murraea.

maculata.

ferruginea. (Leipzig,

Dresden) Hr. Eberh.

limbata. † 14)

nobilis.

margaritacea.

CHRYSOMELA coriaria.

(Goldhähngen) gottin-
gensis.

metallica. (Frbg.) Hr.
v. Charpentier.

graminis.

cuprea.

haemoptera.

varians.

Centaurii.

Populi. **)

tremula.

staphylaea.

polita.

salicis.

viminalis. (Leipzig.)

Hr. Eberhardt.

10 punctata.

pallida.

lapponica. (Leipzig.)

Hr. Eberhardt.

Polygoni.

cerealis.

14) Peltis limbata d. N.

CHRY SOM. fastuosa.	CRIOCERIS 4 macula-
speciosa. (Dresden)	(Schnurkäfer.) ta. Hr.
praetiosa.	Zschacke.
limbata. (Dresd.)	* merdigera.
carnifex.	* 12 punctata.
sanguinolenta. ** 15)	* cyanella.
marginata. (Dresd.)	* melanopa.
Hr. Zschacke.	* flauipes.
analys. (Leipzig.) Hr.	* rufipes.
Eberhardt.	* Asparagi. 17)
aucta. (Dresden.)	Phellandrii.
marginella.	GALLERVCA Tanacetii.
hannouerana.	(Forchtkäfer.) rustica.
scutellata. 16)	Alni.
flauicans.	Betulae. (Dresden.)
haemorrhoidalis.	Vitellinae.
aenea.	vulgata.
Armoraciae.	Lactucae. (Dresdeu.)
Sophiae.	** coccinea.

15) Die beyden mit ** bezeichneten Chrysomen
sind insecta antiodontalgica.

16) Eine Coccinella d. Neuern.

17) Die mit * bezeichneten Species gehören zum
Genus LEMA F. S.

GALLERVCA ** cruciata. (Dresden.)	GALLER. exoleta. (Frbg. Leipz.) Hr. v. Charpent. Hr. Zschacke.
** Bouistae. (Dresd. Freyberg.) ¹⁸⁾	tabida. (Torgau, Mühlberg, Leipzig.) Hr. Eberhardt, Hr. Zsch.
20 punctata.	orbicularis. (Dresden.) Hr. v. Block.
Nymphaeae.	nemorum. ¹⁹⁾
Capreae.	EROTYLVS morio. Hr. Zschacke.
calmariensis.	rufipes. (Universitäts-holz.)
sanguinea.	CISTELA ceruina.
tenella.	nigripes. Hr. v. Charp. (Fadenkäfer.) cinerea.
nigricornis.	nitidula. (Dresd. Leipz.) (Dresd.) Hr. Eberhardt.
oleracea.	Helxines. (Dresden, Leipzig.)
Napi.	ceramboides. (Dresd.) Hr. Eberhardt.
Hyosciami.	lepturoides.
nigripes. Hr. v. Charp.	rufitarsis. (O Lausitz.) Hr. Pr. Leske.
nitidula. (Dresd. Leipz.)	
Helxines. (Dresden, Leipzig.)	
erythrocephala.	
atricilla.	
4 pustulata.	
rufipes. (Dresd. Leipz.)	

¹⁸⁾ Diese drey Arten ** gehören zum Genus *ENDOMYCHVS* F. S.

¹⁹⁾ Mehrere von diesen gehören zum Genus *ALTICA* des Geoffroy.

CISTELA testacea. (*Freyberg.*) *Hr. v. Charp.*

sulphurea. (*Dresden, Bienitz b. Leipzig.*)

bicolor.

varians. †

laeta. (*Dresden*) *Hr. v. Block.*

murina. (*Dresd. Leipz.*)

thoracica. †

Euonymi.

bipustulata.

humeralis.

CRYPTOCEPHALVS
(*Fallkäfer.*)

longipes. (*Dresd.*)

Salicis. †

* *4 punctatus.*

laetus.

* *tridentatus.*

auritus.

* *4 maculatus.*

* *longimanus.* (*Dresd. Delitzsch, Bienitz.*)

marginatus. (*Dresd.*)
Hr. Eberhardt.

CRYPTOCEPH. *2 punctatus.*

2 maculatus. *Herr Zschacke.*

cordiger.

Bothnicus. (*Leipzig.*)
Hr. Zschacke.

Vitis.

Coryli. (*Bienitz.*)

6 punctatus.

cyaneus. *Hr. Zsch.*

bucephalus.

sericeus.

nitens. (*Dresden.*)

quadrum.

labiatus.

flauilabris.

flauipes. (*Dresd.*) *Hr. Eberhardt.*

Moraei.

8 guttatus.

10 punctatus.

hieroglyphicus. *Hr. v. Charpentier.*

2 pustulatus.

CRYPTOC.	* Scopolinus?	LYTTA	vesicatoria.
	* paracentesis. ²⁰⁾	(Reizkäfer.)	
Pini.	Hr. M. Schwägr.	MYLABRIS	Cichorei.
pusillus.		(Fliegenk.)	Fueslini.
			Hr. M. Schwägr.
HISPA	atra.		
(Stachelkäf.)	2 pustulata. (Mühlb.)	LYMEXYLON	dermes-
	Hr. Eberh.	(Holzbohrer.)	toides.
pectinicornis.		nauale.	Hr. Zschacke.
mutica.		flauipes.	Hr. Zsch.
		morio.	
DRYOPS	aenea. Herr	CYCIVIS	flauipes.
(Steinkäf.)	Zschacke.	(Rindenkäf.)	pallens.
TILLVS	elongatus. ²¹⁾		(Dresden.)
(Rauchkäf.)		testaceus.	(Dresden.)
LAGRIA	pubescens.	LAMPYRIS	noctiluca.
(Schmalkäf.)	(Dresden, Leipz.)	(Leuchtkäf.)	splendi-
			dula.
atra.	(Dresd.)	italica.	(Leipzig.) Hr.
nigra. ²²⁾		Eberhardt.	
coerulea. ²²⁾		PYROCHROA	coccinea.
CEROCOMA.	Schaefferi.	(Feuerkäfer)	pectini-
(Kronenkäf.).	Schreberi.		cornis.

²⁰⁾ Die mit einem * bezeichneten Arten gehören zu dem neuen Genus *CLYTHRA* F. S.

²¹⁾ Ein *CLERYS* d. N.

²²⁾ Zum Genus *MELYRIS* d. N.

LYCVS	sanguineus.	coerulea. ²³⁾
(Brandkäf.)	Aurora.	simplex.
	(Düben.) Hr.	TRICHIVS. Eremita.
	M. Schwägr.	(Schirmblumenk.) nobi-
minutus.	Hr. M. Schw.	lis. (Dresd. Leipz.)
MORDELLA	aculeata.	8 punctata.
(Stachelkäf.)	fasciata.	fasciatus. (Sachsenburg,
2 maculata.		W. Schneeberg, Dres-
abdominalis.		den, Freyberg.)
humeralis.		hemipterus.
atra.	Hr. M. Schwägr.	CETONIA aurata.
thoracica.	(Freyberg.)	(Goldkäfer) fastuosa.
	Hr. v. Charpentier.	(Dresd.)
frontalis.		marmorata.
flaua.		metallica.
DONACIA	crassipes.	morio. (Dresden.) Hr.
(Flusspflan-	Festucæ.	Eberhardt.
zenkäfer)	clauipes.	hirta. (Tharandt.)
discolor.		stictica. (Dresd.) Herr
bicolora.		Eberhardt.
fusca.		MELOLONTIA Fullo.
aenea.		(Maykäfer.) vulgaris.
vulgaris.		occidentalis. (Dresd.)

23) Diese fünf Species findet man in Museo Leskeano no. 589. 591. 592. 594. 595. angegeben.

MELOL. solstitialis.	BVPRA. plebeia. (Dresd.)
ruficornis.	Rubi. (Leipzig.) Hr.
brunnea. (Dresden,	Eberhardt.
Leipzig.)	aurulenta. †
Frischii.	tarda. †
Vitis. (Dresd. Leipz.)	4 punctata.
horticola.	manca.
fruticola.	minuta. (Univers. Holz)
agricola. (Dresden,	Hr. Zschacke.
Leipzig.)	viridis.
ruricola. (Mühlberg,	2 guttata.
Torgau.) Hr. Eberh.	linearis. (Frbg.) Hr.
farinosa.	v. Charpentier.
argentea.	atra.
puluerulenta.	elata. †
variabilis.	nitidula. (Dresd. Leipz.)
BVPRESTIS berolinen-	laeta.
(Prachtkäpf.) sis. (Dresd.)	Salicis. (Dresd. Frbrg.)
rutilans. (Dresd.)	cyanea. (Leipzig.)
mariana. (O. Lausitz,	ELATER rufus. (Dresd.)
Leipz.) Hr. P. Leske,	(Springk.) ferrugineus.
Hr. Zschacke.	aterrimus.
9 maculata.	niger.
chrysostigma.	murinus.
decostigma.	holosericeus.
8 guttata. (Dresd.)	

ELATER tesselatus. (Ob. Lausitz) Hr. P. Leske.	ELATER pilosus. (Ob. Lausitz.) Hr. Pr. Leske,
fasciatus. (Dresd.)	minutus.
aeneus.	limbatus.
germanus.	3 maculatus. †
pectinicornis.	buprestoides.
cupreus. (Dresd. Tharandt, Sachsenb. W.)	2 pustulatus.
cruciatus.	4 pustulatus. †
castaneus.	picipes.
liuens.	LVCANVS ceruus.
mesomelus. (Dresden, Leipzig.)	(Schröter) paralelepiped.
linearis.	tenebroides. (Dresd.)
obscurus.	rufipes. (Dresd.)
tristis. (Leipzig.)	caraboides.
marginatus.	PRIONVS faber. (Dresd.)
thoracicus.	(Forstkäuf.) coriarius.
ruficollis.	serrarius. (Dresd.)
brunneus. (Dresd.)	CERAMBYX moschatus.
haematodes. (Dresd.)	(Bockkäf.) Cerdo. (Dresden.)
ephippium.	Heros. (Dresden.)
praeustus.	nebulosus.
sanguineus.	griseus.
balteatus.	crinitus. (Freyb.) Hr. v. Charpentier.

CERAMB. fasciculatus.	SAPERDA scalaris. Hr.
hispidus.	Zschacke.
pilosus.	oculata.
LAMIA textor.	linearis.
(Zauberck.) aedilis.	cylindrica.
sutor.	cardui.
sartor.	nigricornis.
curculionoides.	suturalis. (Leipz.) Hr.
fuliginator.	Pr. Leske.
STENOCORVS lamed.	populnea.
(Zahnbock.)	tremula. †
CALOPVS serraticor-	dubia.
(Holzbock.) nis. (Frbg.	testacea.
Leipzig.)	brunnea.
RHAGIVM mordax.	violacea?
(Zangenbock) inquisi-	praeusta.
tor.	lineola. (Leipz.) Hr.
indagator.	Eberhardt.
cursor. (Tharandt.)	CALLIDIVM Baiulus.
Hr. Eberhardt.	(Widderkäf.) fennicum.
Noctis. (Tharandt)	ebulinum? (Dresd.)
Hr. Eberhardt.	clauipes.
bifasciatum. (Dresd.)	violaceum.
minutum.	femoratum.
SAPERDA Carcharias.	fulcratum. †
(Schneckenk.) Hr. Zsch.	

CALLID. punctatum. † LEPT. hastata.

variabile.

melanura.

rusticum.

liuida.

agreste. †

sanguinolenta.

sanguineum.

rubra. (im Linkelschen
Holze) Hr. Zsch.

testaceum. (Leipzig.)
Hr. Zschacke.

testacea.

luridum.

atra.

fuscum.

suturalis. †

triste.

femorata.

striatum.

ruficornis.

Salicis.

nigra.

pusillum.

praeusta.

vndatum.

4 guttata. (Bienitz.)
Hr. Zschacke.

atomarium. †

4 maculata. (im Sach-
senburger Walde)
Hr. Zschacke.

arenatum.

arietis.

interrogationis. (Dres-
den.)

plebeium. (Dresd.)

Gazella.

detritum.

8 maculata.

Verbasci.

attenuata.

ornatum. (Frbg.) Hr.
v. Charpentier.

calcarata.

mysticum.

subspinosa.

LEPTVRA vnipunctata.
(Schmalbock) (Dresd.)

4 fasciata.

6 guttata.

LEPT. chrysomeloides.	BOSTRICHVS typogra-
collaris. Hr. Zschacke. (Borkenkäf.)	phus.
virginea. (im Sachsen-	chalcographus.
burger Walde.) Hr.	polygraphus.
Zschacke.	Scolytus.
NECYDALIS viridissima.	pygmaeus. †
(Fliegenkäf.) coerule-	piniperda.
scens.	minimus.
virescens.	
sanguinicollis.	BRUCHVS Pisi. (Leipz.)
rufa. (Dresd.)	(Muffelkäf.) Hr. Eber-
Podagrariae.	hardt.
simplex.	granarius.
MOLORCHVS abbrevia-	seminarius. (Belzig.)
tus.	Hr. Eberhardt.
umbellatarum.	flauicornis. †
SPONDYLIS buprestoi-	ANTHRIBVS albinus.
des.	(Bürstenk.) latirostris. †
SYNODENDRON cylindri-	(Dresden,)
cum. (Sebnitz. Frbg.)	albirostris. (Dresd.)
chalcographum. (Frei-	niueirostris. †
berg.)	planirostris. (Dresd.)
APATE hamatus. Hr.	scabrosus. (Dresd.)
(Splintkäf.) Pr. Leske.	pubescens. †
capucinus.	varius. (Freyberg) Hr.
Fagi.	v. Charpentier.

ATTELABVS	Coryli.	CVRG. Pini.	Hr. Zsch.
(<i>Afterrüsselk.</i>)	curcu-	Iaceae.	
	lionoides.	Cynarae?	
pubescens.		Colon.	(<i>Dresd. Frbrg.</i>
Bachus.			<i>Leipzig.</i>)
Betuleti.		bimaculatus.	(<i>Dresd.</i>
Populi.			<i>Freyberg.</i>)
aequatus.		punctum. †	
coeruleocephalus.		2 lineatus.	
cupreus.		porculus. †	
aeneus.		abbreviatus. †	
cuprirostris.		Equiseti.	(<i>Dresden,</i>
Alliariae.			<i>Freib.</i>) Hr. v. Charp.
Craccae.		atrirostris.	Hr. Pr.
Sorbi.			<i>Leske.</i>
flauipes.	(<i>Frbg.</i>) Hr.	Pruni.	
	v. Charpentier.	Campanulae.	(<i>OLau-</i>
purpureus.			<i>sitz</i>) Hr. Pr. <i>Leske.</i>
frumentarius.		nigrirostris.	(<i>Leipzig</i>)
Betulae.			<i>Hr. Eberhardt.</i>
RHINOMACER	curculio-	Salicariae.	Herr M.
(<i>Dickkäf.</i>)	noides.		<i>Schwägrichen.</i>
	(<i>Dresd.</i>)	pericarpus.	
CVRCVLIO *	Longiro-	Sisymbrii.	(<i>Dresden,</i>
(<i>Rüs-</i>	stres femori-		<i>Freyberg.</i>)
<i>selkäf.</i>)	bus simplicibus.	Capreae.	(<i>Dresd.</i>)

Cvrc. vnifasciatus. †

acridulus.

Plantaginis.

Rumicis.

granarius.

paraplecticus.

anguinus. (*Dresden,*
Leipz.) Hr. Eberh.

filiformis. (*Dresden.*)

Hr. Eberhardt.

angustatus. (*Dresd.*)

Hr. Eberhardt.

Bardanae.

Ascanii. (*Dresd. Frbg.*)

** *Longirostres femori-*
ribus dentatis.

caliginosus. (*Dresd.*)

Hr. Eberhardt.

abietis.

Lapathi.

Magniferae?

germanus. (*Liebert-*
wolkwitz.)

Scrophulariae.

Thapsus.

Cvrc. Verbasci. (*Fran-*

ckenberg.)

Solani. †

5 punctatus.

guttula.

abbreviatulus. †

didymus.

villosus.

carbonarius.

atterimus.

Cerasi.

violaceus.

Nucum.

Cerasorum.

tenuirostris. (*Dresd.*)

Hr. Eberhardt.

druparum.

melanocephalus. †

Pomorum.

vorax. Hr. M. Schw.

tortrix.

*** *Longirostres femo-*
ribus posticis sal-
tatoriis.

Cvnc. Saliceti. (Leipz.)	Cvnc. Coryli. (Dresden,
Hr. M. Schwägrich.	Frbg.) Hr. v. Char-
Beccabungae. Herr	pentier.
Zschacke.	
Salicis. (Dresd. Frbg.)	globatus. (Dresd.)
Jota. (Dresd, Frbg.)	lineatus.
Hr. v. Charpentier.	
Populi.	lunatus. Hr. Zsch.
**** Breuirostris femo-	fuluipes. †
ribus muticis.	ruficollis. †
viridis.	hirsutulus.
fulvus.	scabriculus. Hr. Zsch.
palliatu.	ceruinus.
nebulosus. (Dresden.)	cloropus.
marmoratus.	multipunctatus. †
sulcirostris.	tristis. (Leipzig) Hr.
emarginatus. †	Eberhardt.
glaucus.	raucus.
albidus.	punctatus.
incanus.	obscurus. (Dresden.)
micans. Hr. M. Schw.	Hr. Eberhardt.
Polygoni.	niger.
griseus. (Dresd.) Hr.	variolosus.
Eberhardt.	vittatus?
moerens. †	depressirostris. †
	senex. (Dresd.)

CYRUS. *****	BREUIROSTRES MYCETOPHAGUS 4 ma-
femoribus denta-	(Pffferkäfer) culatus.
tis.	atomarius. †
fuscomaculatus.	sanguinicollis. †
(Dresden, Freyberg.)	piceus.
Ligustici.	nigricornis. †
Zebra. †	metallicus. †
nubilus. (Dresd. Frbg.)	testaceus.
nigrita. Hr. Zschacke.	bifasciatus. †
sulcatus.	HYPOPHLAEVS Casta-
Morio.	(Pochkäfer.) neus.
Pyri.	bicolor. Hr. v. Charp.
lepidopterus.	LYCTVS politus.
Mali. (O Lausitz) Hr.	(Kielkäf.) depressus.
Pr. Leske.	(Dresden.)
argentatus.	2 pustulatus. †
grammicus. (Leipzig)	Iuglandis. †
Hr. M. Schwägr.	crenatus.
viridanus.	canaliculatus (Düben)
oblongus.	Hr. M. Schwägr.
ouatus.	dermestoides, (Dresd.)
albolineatus. †	Hr. v. Block.
COLYDIUM filiforme, †	TRITOMA bipustulata.
(Drahtkäfer)	sulca- (Staubkäfer.) rufipes.
tum.	(Leipz.) Hr. Eberh.

TRIT. sericea. ²⁴⁾	STAPHYLINVS hirtus.
TETRATOMA fungorum.	(Raubkäfer.)
(Hackenkäfer) (Frbrg.)	nebulosus.
Hr. v. Charp.	murinus.
IP S bipustulata. †	pubescens. Herr M.
(Rindennager) (Dresden,	Schwägrichen.
Tharandt.) Hr.	olens.
Eberhardt.	similis.
4 pustulata.	maxilloso.
4 guttata.	dilatatus. †
nigripennis.	erythropterus.
aenea. †	aeneocephalus.
DIAPERIS Boleti.	fossor.
(Herzkäfer) violacea.	splendens.
(Leipz.) Hr. M.	politus.
Schwägrichen.	strumosus. †
MELOE Proscara-	2 pustulosus.
(Maywurmkäf.) baeus.	2 guttatus. Hr. M.
maialis.	Schwägrichen.
tecta. (Leipzig)	clauicornis.
breuicollis.	fuscipes.
	angustatus.

²⁴⁾ Hierher gehören die *PTOMOPHAGI* der Neuern.

STAPH. canaliculatus.	OXYR. crysomelinus.
rufipes.	pygmaeus. (<i>Dresd.</i>)
floralis. <i>Hr. M. Schw.</i>	obtus.
caraboides.	PAEDERVS riparius.
rugosus. <i>Hr. Zsch.</i>	ruficollis. <i>Hr. Zsch</i>
piceus. ²⁵⁾	elongatus.
OXYPORVS rufus.	fulgidus.
(<i>Stumpfkäf.</i>) maxillo-	filiformis.
sus.	orbiculatus. <i>Hr. M.</i>
lunulatus.	<i>Schwägr.</i>
bipustulatus.	melanocephalus.
flauipes.	suturalis. (<i>Dresd.</i>) <i>Hr.</i>
	<i>v. Block.</i>

Zweyte Ordnung.

LOCUSTAE (*Heuschrecken.*)

(*Hemiptera* L. *Vlonata* F.)

FORFICVLA	auricula-	BLATTA	orientalis.
(<i>Zangenkäf.</i>)	ria.	(<i>Schabe</i>)	variegata.
minor.			(<i>Chemnitz.</i>)

25) Hierher gehört der *PSELAPHVS DRESDEN-*
SIS des *Hrn. Herbst.*

BLATTA lapponica.	LOCUSTA viridissima.
(Univers. Holz) Hr.	(Heuschr.) verrucivora,
Zschacke.	varia.
germanica. (Dresd.)	brachyptera.
MANTIS pagana. ²⁶⁾	clypeata. (Frbrg.) Hr.
(Fangheu- (Frbrg.) Hr.	v. Charpentier.
schrecke) v. Charpent.	GRYLLVS migratorius.
ACRYDIVM bipuncta-	(Grashüpfer) stridulus.
tum.	italicus. (Dresden.)
subulatum.	coerulans.
ACHETA Gryllotalpa.	coerulescens.
domestica.	2 guttatus.
campestris.	viridulus.
	rufus.

Dritte Ordnung.

HEMEROBII (Florfliegen.)

(Aptera et Neuroptera L. Synistata F.)

LEPISMA sacharina.	PODVRA niualis.
(Schuppen- polypoda. (Fufsschwanz-	arborea.
thiergen.) (Frbrg.) Hr.	thiergen.) plumbea.
v. Charpent.	(Leipz.) Hr. M. Schw.

²⁶⁾ Mantispa d. N.

EPHEMERA * cauda tri-	PHRYG. longicornis.
(Tagfliege) seta.	3 punctata. †
vulgata.	pusilla. Hr. Zschacke.
halterata. (Leipzig.)	HEMEROBIVS perla.
** cauda biseta.	(Florfliege) albus.
bioculata.	chrysops.
culiciformis.	phalaenoides.
diptera.	striatulus. ²⁷⁾
SEMBLIS at ata?	MYMELEON formica-
bicaudata.	(Afterjungfer) rium.
nebulosa.	(Wittenberg.) Hr.
	M. Schwägrichen.
PHRYGANEIA reticulata.	ASCALAPHVS barbarus.
(Wassermotte) striata.	PANORPA communis.
pilosa.	(Scorpionfliege) germa-
grandis.	nica.
irrorata. Hr. Zschacke.	hyemalis. † (Leipzig.)
rhombica.	Hr. M. Schwägr.
notata.	RAPHIDIA ophiopsis.
nigra.	(Kameelfliege) notata.
interrupta. Hr. Zsch.	Hr. M. Schwägr.

27) Jetzt ein Psocys F. S.

Vierte Ordnung.

V E S P A E (*W e s p e n.*)

(*Hymenoptera* L. *Piezata* F.)

CYNIPS	rosae.	TENTHR. enodis.
(<i>Galwespe</i>)	Quercus	clauicornis. Hr. Zsch.
	inferus.	costalis.
Fagi.		Rosae.
Amerianae.		annulata.
TENTHREDO	* <i>antennis</i>	*** <i>antennis pectinatis.</i>
(<i>Blattwespe</i>)	<i>clauatis.</i>	nemorum. †
femorata.		frutetorum. †
lucorum. (<i>Freyberg.</i>)		Iuniperi.
Hr. v. Charpentier.		Pini.
lutea.		**** <i>antennis filiformi-</i>
Amerinae.		<i>bus articulis 7 - 9.</i>
marginata.		Scrophulariae.
laeta. F. S. †.		Salicis.
Vitellinae.		luteicornis.
sericea.		viridis.
** <i>antennis inarticu-</i>		Rapae.
<i>latis extrorsum</i>		Cerasi.
<i>crassioribus.</i>		nassata.
vstulata.		

TENTHR. ouata.

pauida.

Abietis.

analis. †

germanica.

liuida.

albicornis,

gonagra.

atra.

cincta.

rustica.

Morio.

septentrionalis.

punctum.

blanda. Hr. Zschacke.

nigra. Hr. Zschacke.

***** antennis filiformibus articulis plurimis.

erythrocephala.

syluatica.

Populi.

Betulae.

campestris. †

pratensis. †

saltuum.

SIREX

(Schwanz-
wetpe)

fuscicornis. †

spectrum.

iuuencus.

nigrita. †

camelus.

dromedarius.

pacca.

mariscus.

trogodyta. †

pygmaeus.

ICHNEUMON

(Schlupfwespe)

Gigas.

magus. †

nigricornis.

Hr. Zsch.

* scutello

albido,

antennis albo

annulatis.

sugillatorius.

molitorius.

culpatorius.

raptorius.

sarcitorius.

crispatorius.

extensorius.

armatorius.

ICHN. saturatorius.

glaucatorius. †

natatorius. F. S. †

infractorius.

ambulatorius. *Herr
Zschacke.*

praecatorius. †

pisorius.

** *scutello albo, anten-
nis nigris totis.*

luctatorius.

laminatorius F. S. †

occisorius. †

vaginatorius.

maculatorius. †

persuasorius.

vagatorius. †

fusorius.

deliratorius.

fossorius.

punctorius. †

*** *scutello thorace con-
colore, antennis
fascia annulatis.*

comitator.

ICHN. annulator. †

luteator F. S. †

irrigator. †

dimidiator.

abbreviator. †

incubitor.

exhortator.

**** *antennis nigris to-
tis scutello tho-
race concolore.*

desertor.

serrator F. S. †

vrinator F. S. †

minutator F. S. †

arrogator. *Hr. Zsch.*

lapidator. †

denigrator.

manifestator.

firmator F. S. †

mandator. †

moschator.

turionellae.

mensurator.

campanulator. F. S. †

deprimator. F. S. †

ICHN. emarciator. F. S. †	ICHN. festiuus. F. S. †
clauatus. F. S. †	***** <i>minuti antennis</i>
variegator. Hr. Zsch.	<i>filiformibus, ab-</i>
acuminator. †	<i>domine ouato ses-</i>
strigator. †	<i>sili.</i>
scabrator. †	Bedeguaris.
gravidator.	quadrum.
pugillator.	2 maculatus. †
moderator.	Sphegum. (Dresden.)
erigator. †	glomeratus.
irrorator,	festinans. F. S. †
ruspator.	pulicarius. †
iaculator.	fasciatus. †
assectator.	pedicularius. † 28)
***** <i>antennis luteis.</i>	EVANIA maculata. (Uni-
luteus.	<i>vers. Holz) Hr. Zsch.</i>
ramidulus.	variegata. F. S. †
glaucopterus.	histrio. F. S. †
vmbratus F. S. †	ruficollis. F. S. †

28) Hierher gehören die neuen Genera *BANCHUS* *OPHION* und *FOENUS* F. S. und die neuen Species *Banchus histrio* †. *Ophion obscuratus* †. *O. foliator* †. Überhaupt verdiente das ungemein zahlreiche Genus *ICHNEUMON* seiner Sexual und Ortvarietäten wegen eine Monographie.

CHALCIS	sispes.	SCOLIA	4 punctata.
(Zahnwespe)	clauipes. †	CHRYSIS	fulgida.
minuta.	Hr. Zsch.	(Goldwespe)	purpurata. †
pusilla. †			
SPHEX	* abdomine	ignita.	
(Sandwespe)	petiolato.	bidentata.	
sabulosa.		lucidula.	
arenaria.		aenea. †	
lutaria.		aurata.	
Figulus.	Hr. Zsch.	cyanea.	
** abdomine sessili.		BEMBEX	rostrata (Dresd.)
fusca.		VESPA	Crabro.
* viatica.		(Wespe)	vulgaris.
* nigra.		germanica.	
* variegata. †		gallica.	
* hyalinata. †		saxonica.	
* fuscata. † 29)		rufa.	
TIPHIA	femorata.	parietum.	
(Leipzig.)	Hr. Zsch.	serripes.	
glabrata.	F. S. †	muraria.	
hemiptera.	F. S. †	spinipes.	(Freyberg)
SCOLIA	haemorrhoid.	Hr. v. Charpentier.	
prisma. †		6 fasciata.	Hr. Zsch.

29) Die mit einem * bezeichneten Arten gehören zum neuen Genus *POMPILVS* F. S.

VESPA bidens.

bifasciata. (*Leipzig.*)

Hr. M. Schwägr.

3 fasciata. *Hr. Zsch.*

minuta. F. S. †

flauipes?

coarctata.

MELLINVS mystaceus.

bipunctatus. F. S. †

variegatus. F. S. †

interruptus. F. S. †

campestris.

aruensis.

PHILANTHVS arenarius.

CRABRO fossorius.

4 cinctus. *Hr. Zsch.*

cribrarius.

clypeatus.

scutatus.

vagus.

pictus. †

tridens. F. S. †

crassipes. F. S. †

tibialis. F. S. †

varicornis. F. S. †

CRABRO vniglumis.

lineatus. †

3 spinosus. †

leucostoma.

geniculatus. (*Leipz.*)

Hr. M. Schwägr.

lugubris. †

albilabris. †

HYLAEVS cylindricus.

(*Leipz.*) *Hr. M. Schw.*

maxillosus.

annulatus.

ANDRAENA coerules-
(*Ringbiene*) cens.

spiralis. (*Freyb.*) *Hr.*
v. Charpentier.

labiata.

aenea.

marginata.

heluola. (*Leipz.*) *Hr.*

M. Schwägrichen.

pilipes.

succincta.

APIS terrestris.

(*Biene*) ruderata. *Hr.*

Zschacke.

APIS nemorum. Hr. Zsch.	APIS coecutiens.
lapidaria.	EVCERA longicornis.
sylvarum.	tumulorum.
muscorum.	linguaria.
soroensis. (Frbg.) Hr.	NOMADA variegata.
v. Charpentier.	ruficornis.
hypnorum.	Fabriciana. (im Linkler
pratorum. Hr. Zsch.	Holze) Hr. Zsch.
lucorum.	gibba. Hr. Zschacke.
aceruorum.	Hattorfiana.
senilis. Hr. Zschacke.	FORMICA herculanea.
seminuda.	(Ameise) rufa.
lagopoda.	fusca.
pilipes. Hr. Zsch.	omniuora. Hr. Zsch.
mellifica.	caespitum.
cineraria.	vagans.
haemorrhoea.	MVTILLA europaea.
manicata.	(Afterbiene.) maura.
maculata.	(Dresden.)
bicornis.	hungarica. †
rufa.	coronata. †
mystacea. Hr. Zsch.	halensis. †
centuncularis.	ephippium. †
punctata. Hr. Zsch.	ciliata. †
4 dentata.	rufipes.

Fünfte Ordnung.

LIBELLULAE (*Wasserjungfern*.)

(*Neuroptera* L. *Odonata* F.)

LIBELLULA 4 *maculata*. *LIBELL.* *vulgata*.
(*Wasser-* *depressa*. *aenea*.
jungfer) *flaueola*. *AESHNA* *forcipata*.
rubicunda. (*Leipzig*.) *grandis*.
Hr. M. Schwägr. *AGRION* *Virgo*.
vulgatissima. *puella*.

Sechste Ordnung.

SCOLOPENDRAE (*Scolopendern*.)

(*Aptera* L. *Mitosata* F.)

SCOLOPENDRA *lagura*. *IVLVS* *terrestris*.
(*Scolopender*) *forficata*. *sabulosus*.
electrica.
IVLVS *complanatus*. *ONISCVS* *pustulatus*.
(*Vielfuss*) *crassus*. (*Uni-* (*Kellerassel*) *Asellus*.
vers. Holz) *Hr. Zsch.* *Armadillo*.

Siebente Ordnung.

ARANEAE (Spinnen.)

(Aptera L. Vnogata F.)

TROMBIDIUM holosericeum.
aquaticum.

ARAN. ***** oculis :: ::
fimbriata (Frbg.) Hr.
v. Charpentier.

ARANEAE * oculis . :: :: .
(Spinne) nigrita (Dresd.)

scenica.

pubescens.

globosa.

***** oculis . :: :: .

** oculis . : . : .

senoculata.

horrida.

PHALANGIUM Opilio.

domestica.

(Afterspinne) cornutum.

tricuspidata.

bimaculatum. (Dresd.)

*** oculis . : : : .

Hr. v. Block.

angulata.

horridum. (Dresden.)

diadema.

Hr. v. Block.

aquatica.

carinatum. (Dresd.)

scorpiformis.

SCORPIO cancroides.

**** oculis . : : .

(Scorpion.)

saccata.

Achte Ordnung.

C A N C R I (K r e b s e.)

(Aptera L. Agonata F.)

ASTACVS fluviatilis.	MONOC. Pediculus.
MONOCVLVS Apus.	CYMOTHOA aquatica. 30)
(Kiefenfuss) Pulex.	GAMMARVS locusta.
quadricornis.	pulex.

Neunte Ordnung.

PAPILIONES (Schmetterlinge.)

(Lepidoptera L. Glossata F.)

PAPILIO (Tagvogel)	PAP. Aegeria.
** Equites Achiui.	Cardui.
Podalirius.	Iris.
Machaon.	Ilia. (Dresd.)
**** Nymphales.	Populi.
Io.	Antiopa.
Megaera.	Atalanta.

30) Jezt Idotea aquatica F. S.

Pap. Polychloros.

V. album.

Xanthomelas Esp.

(Leipzig.) Hr. M.

Schwägrichen.

Vrticae.

C. album.

Paphia.

Aglaia.

Adippe.

Lathonia.

Euphrosine.

Selene. (Grimma.)

Niobe.

***** Parnassii.

Mnemosyne?

Crataegi.

***** Danai.

Brassicae.

Rapae.

Napi.

Sinapis.

Daplidice.

Cardamines.

Palaeno.

Pap. Hyale.

Rhamni.

***** Satyri.

Hyperanthus.

Pamphilus.

Arcanius.

Sabaeus.

Hero.

Fauna. (Dresd.)

Maera. ((Dresd. Frbg.
Sachsenb. Wald.)

Deianira.

Briseis.

Semele.

Hermione. (Chemnitz.)

Phaedra. (Univ. Holz)
Herr Zschacke.

Ligea. (Thüringen.)

Medusa.

Epiphron. (Dresden.)

Blandina. (Chemnitz.)

Cassiope.

Galathea.

Ianira.

Iurtina.

}
}

PAP. Eudora.

Sibilla. (*Chemnitz.*)
 Lucina. (*Bienitz.*) Hr.
Zschacke.
 Cinxia.
 Phoebe.
 Athulia? (*Grimma.*)
 Dictynna. Hr. Zsch.
 Cynthia.
 Matura.
 Dia. (*Dresd. Grimma.*)
 Leuana.
 Prorsa.

HESPERIA * *Rurales.*

Betulae.
 Pruni.
 Spini.
 Quercus.
 Linceus. (*Univ. Holz*)
Hr. Zschacke.
 Boetica.
 Amyntas.
 Rubi.
 Meleager. (*Dresden,*
Freyberg.)

HESP. Arion. (*Zwenkau.*)

Erebus.
 Alcon.
 Damon.
 Cyllarus.
 Argiolus.
 Acis.
 Alsus.
 Argus.
 Corydon.
 Adonis. (*Thüringen.*)
 Hylus.
 Archiades.
 Hippothoe.
 Virgaureae. (*Univers.*
Holz) Hr. Zsch.
 Phlaeas.
 Helle.
 Xanthe. }
 Garbas. }
 ** *Vrbicolae.*
 Comma.
 Linea.
 Syluanus. (*Grimma.*)
 Thaumias. (*Grimma,*
Leipzig.)

HESPER. Paniscus.

Maluae.

Fritillum.

Tages.

SPHINX ocellata.

(Dämme- Populi.

rungsfaller) Tiliae.

Oenotherae. (Dresden,
Chemnitz.)

Nerii.

Atropos.

Pinastri.

Euphorbiae.

Gallii.

Celerio.

Elpenor.

Porcellus.

Conuoluuli.

Ligustri.

SESIA stellatarum.

fuciformis.

bombyliformis. (Grim-
ma, Univ. Holz.)

apiformis.

sphegiformis.

asiliformis.

SESIA culiciformis.

tenthrediniformis.

tipuliformis.

vespiformis.

ZYGAEANA Filipendulae.

Scabiosae. (Freyberg,
Chemnitz.)

Loti. (Frbg. Chemnitz.)

Quercus.

fausta.

Statice.

Pruni. (Leipz.) Hr. M.
Schwägr.

Ephialtes. (Chemnitz.)

BOMBYX * *alis patulis.*

(Spinner) Pauonia min.

Tau.

** *alis reuersis.*

quercifolia.

ilicifolia.

betulifolia.

Fagi.

Trifolii.

Quercus.

Pruni.

potatoria.

BOMBYX Pini.

Dumeti.

versicolora.

Rubi.

vinula.

lanestris.

Populi.

Catax.

Eueria. (*Erzgebürge.*)

processionea.

pithyocampa.

Mori.

neustria.

castrensis.

Hieracii.

*** *alis deflexis.*

dispar.

pudibunda.

fascelina.

bucephala.

coeruleocephala.

argentina. (*Leipz.*)

Ziczac.

tritophus.

Dictaea.

BOMBYX Dromedarius

Coryli.

Monacha.

curtula.

reclusa.

anachoreta.

anastomosis.

palpina.

trepida.

camelina.

vndata.

lubricipeda.

mendica. (*Freyberg.*)

Menthastri. (*Leipzig*)

advena?

luctifera. (*Frbg.*) Hr.
v. Charpentier.

leporina.

compressa.

Milhauseri. (*Dresd.*
Leipzig.)

spretta.

V. nigrum.

chrysorrhoea.

auriflua.

BOMB. bicolora. (*Dresd.* BOMB. Zona. (*Dresden.*)

Leipz.)

vestita.

Salicis.

rosea. (*Dresd. Stolpen,*

Cassinia.

Univers. Holz.)

Crataegi.

rubricollis.

plumigera.

fuliginosa.

russula.

obscura.

Iacobeae.

Cossus ligniperda.

grammica. (*Chemnitz.*)

terebra. (*Leipz.*)

purpurea.

Aesculi. (*Leipz.*)

Plantaginis. (*Dresd.*

HEPIALVS Humuli.

Frankenberg, Chemn.

Zwönitz.)

Iodutta.

Matronula. (*Universi-*

lupulinus.

tätsholz.)

hectus.

villica.

Crux. Hr. Zschacke.

Hebe. (*Dresden.*)

testudo.

Caja.

Asellus.

**** *alis decumbentibus.* NOCTVA ** *thorace laevi*

Hera. (*Dresd.*)

(*Eulen*) *alis planis in-*

Dominula.

cumbentibus.

lugubris. (*Frbg.*)

pallens.

furcula.

Vaccinii. (*Wittenb.*)

antiqua.

Hr. M. Schwägr.

gonostigma.

* complana.

D

Noct. *quadra. 3¹)

*** *thorace laevi, alis
deflexis.*

Batis.

Silene.

rubiginea.

glyphica.

dipsacea.

Ononis. (Leipzig.)

Mi.

mixta. †

albicollis. (Freyberg.)

Hr. v. Charpent.

trapezina.

Cerasi. (Leipzig.)

**** *thorace cristato
alis incumbentibus.*

sponsa.

nupta.

promissa.

Fraxini.

pronuba.

orbana.

Noct. Solani

linogrisea.

paranympa.

fimbria.

janthina.

segetis.

retusa.

maura.

lunaris.

libatrix.

plecta.

C. nigrum.

Nunatrum.

Brassicae.

2 maculosa.

exclamationis.

suffusa.

1. album.

***** *thorace cristato,
alis deflexis.*

fuluago.

croceago. (Grimma.)

3¹) Diese beyden gehören zum neuen Genus
LITHOSIA F. S.

Noctua sulphurago.	Noct. Atriplicis.
(Grimma.)	praecox. (Dresden.)
citrago.	pyramidea.
ferrago.	typica.
flauago.	lucipara.
Chrysitis.	oleracea.
Festucae.	leucomelas.
Artemisiae.	riuularis.
Gamma.	Pinastri.
interrogationis.	Ligustri.
meticulosa.	strigilis.
oo.	aprilina.
gothica.	virens.
derasa.	Psi.
satellitia.	auricoma.
diffinis. (Leipz.)	Lamda.
affinis. (Leipz.)	Chi.
Absinthii.	Aceris.
Alni.	megacephala.
Delphinii.	Baja. (Steinbach bey
Pteridis. Hr. M. Schw.	Borna.)
Linariae.	Persicariae.
Pisi.	Tragopogonis. (Grim-
mendica.	ma.)
Oxyacanthae.	hepatica. (Chemnitz.)

Noc. turca. (Steinbach.) PHAL. thymiaria.

albipecta.

putatoria.

flavocincta.

margaritaria.

eremita. (Leipzig.)

punctaria.

nigricans.

amataria.

flavicornis.

falcataria.

triplacia.

cultraria.

Rumicis.

sambucaria.

exoleta.

lacertinaria.

Verbasci.

alniaria.

Scrophulariae (Leipz.)

syringaria.

Hr. M. Schwägr.

lunaria.

Asteris.

dentaria.

Chamomillae.

consortaria.

Tanaceti.

dolabraria.

umbratica.

papilionaria.

putris.

prunaria.

conformis.

pinaria.

Myrtilli.

atomaria.

Arbuti. Hr. Zschacke.

prosoparia.

PHALAENA * antennis

lichenaria.

(Nachtfalter) pectinatis.

belgaria F. S. †.

lactearia.

pusaria.

vernaria.

annularia.

bupleuraria.

capreolaria.

PHAL. defoliaria.

hirsutaria.

hirtaria.

vespertaria. *Hr. Zsch.*

Wawaria.

pluviaria.

prasinaria.

viridaria.

pulueraria.

fasciaria.

betularia.

prodromaria.

elinguaria.

lingnaria. (*Dresden*.)

purpuraria.

** *antennis setaceis.*

demandata.

cinerata.

viridata.

notata.

grossulariata.

vndulata.

comitata.

prunata.

crataegata.

PHAL. equestrata.

marginata.

hastata.

tristata.

clathrata.

procellata.

fluctuata.

bilineata.

bimaculata.

rubiginata.

centaureata.

adustata.

fimbriata.

4 fasciata.

ocellata.

brumata.

chenopodiata.

centumnotata.

hexapterata.

duplicata.

alchemillata.

psittacata.

luctuata. †

succenturiata.

rubricata.

PHAL. ochreata.

scutata.

immutata.

albulata.

minutata. †

verticata.

potamogata.

stratiolata.

nymphæata.

lemnata.

sambucata.

*** *alis forficatis.*

farinalis.

barbalis. (Crambus

barbatus F. S.)

tentacularis.

proboscidalis.

rostralis. (Crambus

rost. F. S.)

nemoralis. (Crambus

nemor. F. S.)

forficalis. (Crambus

forfic. F. S.)

margaritalis. †

sericealis.

PHAL. verticalis.

salicalis.

punctalis.

pinguinalis. (Cramb.

ping. F. S.)

ferrugalis.

flavialis.

cespitalis.

fluctualis. Hr. Zch.

purpuralis.

atralis.

PYRALIS prasinaria,

(*Blattwickler*) fagana.

viridana.

clorana.

vernana.

vncana. (Chemnitz.)

plumbana.

Hybnerana. †

rosana.

pallidana. (Chemnitz.)

decussana. (Leipzig.)

fuscana.

Hartmanniana.

Xylosteana.

PYRALIS ministrana.	PYRALIS scabrana.
Vdmanniana.	ocellana. <i>Hr. Zsch.</i>
Solandrana.	Bergmanniana.
variegana.	Daldorfana.
Stroemiana.	Penkleriana.
Zoegana.	pomana.
cruciana.	Lipsiana.
obliquana.	dorsana.
profundana.	strigana.
Brynnichana.	Cynosbana.
Iacquiniana.	3 punctana.
marmorana. F. S. †	Mitterbachiana.
Trauniana.	Boeberana.
arcuana.	TINEA colonella. (Cram-
Lecheana.	(Motte) bus colonum
Christiernana. (<i>Dres-</i>	F. S.)
<i>den</i>) <i>Hr. v. Block.</i>	sociella. (Lithosia so-
avellana.	cia F. S.)
Heiseana. (<i>Dresd.</i>)	spissicella. (<i>Chemnitz.</i>)
variana.	euonymella.
Rolandriana.	plumbella.
riuagana.	cornella.
strigulana.	irrorella. (Lithosia
approximana. F. S. †	irrorata. F. S.)
Romanana. (<i>Dresd.</i>)	perlella.

TINEA mesomella.

- guttella. (*Chemnitz.*)
 vinetella. (*Crambus*
vinetorum F. S.)
(Dresden.)
 pratella. (*Cramb. pra-*
torum F. S.)
 pascuella. (*Cr. pas-*
cuum. F. S.)
 culmella. (*Cr. culmo-*
rum. F. S.)
 margaritella.
 falsella.
 tristella.
 carnella.
 tesserella. †
 marmorella. F. S. †
 anella.
 fagella. (*Cramb. Fagi*
 F. S.)
 salicella.
 tetricella. (*Cr. tetrica.*
 F. S.)
 tapezella. (*Pyralis ta-*
pezana. F. S.)
(Chemnitz.)

TINEA parenthesesella.

- punctella.
 leucatella.
 2 punctella.
 8 punctella. †
 dodecella. (*Olausitz*)
Hr. Pr. Leske.
 rupella.
 compositella. (*Pyra-*
lis composana F. S.)
 Fyeslella.
 Goedartella.
 Rhediella.
 Raiella.
 parallela. (*Dresden.*)
Hr. v. Block.
 Cramerella.
 triangulella. (*Dresden*)
Hr. v. Block.
 exiguella.
 aurella. (*Leipz.*)

ALVCITA Xylostella.
 (*Ypsolophus Xy-*
lostei F. S.)

- dentella. (*Ypsolophus*
dentatus. F. S.)
(Chemnitz.)

ALVCITA flauella (Ti-	ALVCITA Degeerella.
nea fl. F. S.)	striatella.
vitella (Yps. vittatus.	vindella.
F. S.) (Leipz.)	PTEROPHORVS didacty-
nyctemerella.	(Federmotte) lus. (Chem-
maculella. (Yps. ma-	nitz.)
culatus. F. S. †)	calodactylus. (Chemn.)
variella. †	3 dactylus.
dorsella. (Yps. dor-	rhododactylus. Hr.
satus. F. S.)	Zschacke.
Swammerdammella.	tesseradactylus.
Frischella.	pentadactylus.
Calthella.	hexadactylus.

Zehnte Ordnung.

C I M I C E S (W a n z e n.)

(Hemiptera L. Rhyngota F.)

FVLGORA europaea.	FVLG. flauescens. †
(Laterenträger) minuta. †	striata. †
limbata. †	MEMBRACIS aurita.
pellucida.	cornuta.

CICADA	cunicula-	NEPA	cinerea.
(Singheuschrecke)	ria?	(Wasserscorpion)	
vittata.		RANATRA	linearis.
lateralis.		NAVCORIS	cimicoides.
interrupta.		ACANTHIA	lectularia.
lineata. †		flauipes. †	
flauicollis.		pallicornis. †	
viridis.		coriacea.	
lanio.		littoralis.	
neruosa.		Betulae.	
Rosae.		crassipes. (Dresd.)	
splendida. †		Cardui.	
vlmi. (Leipzig.)		CIMEX	* Scutellati
CERCOPIS	sanguino-	(Wanze)	scutello lon-
lenta.			gitudine ab-
spumaria.			dominis.
coleoptrata.		nigrolineatus.	
fasciata.		maurus. Hr. Zsch.	
2 fasciata.		scarabaeoides.	
Dionysii. (Frbg.) Hr.		fuliginosus.	
v. Charpent.		inunctus. (Frbg.) Hr.	
NOTONECTA	glauc.	v. Charpentier.	
(Wasserwanze)	furcata.	** Spinosi thorace utrim-	
(Frbg.) Hr. v. Charp.		que spina armato.	
minutissima.		hidens.	
SIGARA	striata.	rufipes.	

CIMEX nigricornis.

punctatus.

haemorrhoidalis.

*** Ouati thorace mu-
tico.

prasinus.

iuniperinus.

dumosus.

litturatus. (*Leipzig.*)
Hr. M. Schwägr.

baccarum.

ornatus.

festivus.

2 punctatus. Hr. Zsch.

bicolor.

oleraceus.

2 guttatus.

coeruleus.

flauicornis.

Morio.

tristis ?

spinipes. Hr. Zsch.

melanoceph. Hr. Zsch.

acuminatus.

chlorizans. (*Dresden.*)
Hr. v. Block.

COREVS marginatus.

quadratus.

LYGAEVS thorace mu-
tico.

equestris.

Hyoscyami.

apterus.

Pini. (*OLausitz*) Hr.
Pr. Leske.

Rolandri.

crassicornis.

Coryli.

campestris. (*Leipzig.*)
Hr. M. Schwägr.

Populi.

ater.

2 fasciatus.

flauicollis.

seticornis.

capillaris.

MIRIS dolabratus.

laeuigatus.

lateralis.

pabulinus.

ferus.

MIRIS striatus.	APHIS Rosae.
Abietis.	Atriplicis.
GERRIS lacustris.	Dauci.
stagnorum.	Vrticae.
tipularius.	Vlmi.
clauipes. (Leipz.) Hr.	Acetosae.
M. Schwägrichen.	Viciae.
REDUVIVS personatus.	CHERMES Betulae.
annulatus.	(Blattfloh) Graminis.
iracundus?	Abietis.
albipes.	Coccvs Hesperidum.
PULEX irritans.	(Schildlaus) Quercus.
APHIS longirostris.	THRIPS Physapus.
(Blattlaus) (Dresden.)	(Blasenfuss) fasciata.
Capreae.	minutissima.
Cardui.	

Eilfte Ordnung.

M V S C A E (F l i e g e n.)

(Diptera et Aptera L. Antliata F.)

OESTRVS Bouis.	OESTR. haemorrhoid.
(Bremse) Equi.	veterinus.

OESTRVS Ovis.

TIPVLA * *alis paten-*
(Schnake) *tibus.*

pectinicornis.

riuosa.

sinuata. Hr. Zsch.

crocata.

hortorum.

oleracea.

variegata.

lunata.

pratensis.

atrata.

picta. †

regelationis.

** *alis incumbentibus.*

plumosa.

Histrio. †

gibba. †

littoralis.

monilio.

* breuicornis.

TIPVLA * hortulana.

Marci.

* Pomonae.

* Thomae. ³²⁾ Hr.

Zschacke.

palustris.

sericea. Hr. Zschacke

BIBIO plebeia.

anilis.

ANTHRAX morio.

maura.

hottentotta.

STRATIOMYS testa-
(Waffenfliege) cea. ³³⁾

(Univers. Holz). Hr.

Zschacke.

chamaeleon.

ephippium.

Microleon.

argentata. †

tigrina. Hr. Zsch.

Hydroleon.

32) Die mit einem * bezeichneten Arten gehören
zum Genus *HIRTEA* F. S.

33) Ein *SICS* F. S.

STRAT. viridula.

Hypoleon. }

Macroleon. }

clauipes.

conica. (Dresd.) Hr.
v. Block.

vngniculata. (Dresd.)
Hr. v. Block.

RHAGIO scolopaceus.
(Schnepfenfliege) trin-
garius.

maculatus.

Diadema.

SYRPHVS * *antennis plu-*
matis.

inanis.

pellucens.

bombylans.

mystaceus.

apiarius.

intricarius.

SYRPH. ** *antennis seta*
nuda.

pendulus.

floreus.

subcoleoptratus. ³⁴⁾

nemorum.

arbustorum.

tenax.

lucorum.

fallax.

clauipes. Hr. Zsch.

* 2 cinctus.

* arcuatus.

* mutabilis.

* deuius.

segnis.

femoratus.

* conopseus.

* ichneumoneus.

* sphegeus. ³⁵⁾ Hr.

Zschacke.

34) *THEREVA* subcoleoptrata F. S.

35) Die mit einem * bezeichneten Arten gehö-
ren zum neuen Genus *MVLIO* F. S.

Syrph. vespiformis.	Musca cadauerina.
flauicornis.	mortuorum.
sepulchralis.	vomitoria.
lugubris. Hr. Zsch.	cyanea. Hr. Zschacke.
coemiteriorum.	coruina.
metallinus.	pallida. Hr. Zschacke.
glaucius.	canina.
noctilucus.	meditabunda. Hr.
Ribesii.	Zschacke.
Pyrastri.	** antennis seta uuda.
Thymastri.	fera.
mellinus.	grossa.
scriptus.	tremula.
pipiens.	rotundata.
gibbosus.	larvarum.
Musca * antennis seta	radicum.
(Fliege) plumata.	brassicaria.
meridiana.	lateralis.
carnaria.	albifrons. Hr. Zsch.
lardaria.	canicularis.
rutilans. Hr. Zschacke.	pluvialis.
maculata.	chorea.
domestica.	roralis.
Caesar.	serrata.
cornicina. Hr. Zsch.	meteorica.

MUSCA putris.	MUSCA flava.
* cupraria.	Cerasi.
aurata.	Cardui.
* polita. ³⁶ *	Syngenesiae.
corrigiolata. Hr. Zsch.	solstitialis.
vngulata.	femorata. (Dresd.) Hr.
nobilitata.	v. Block.
rostrata. Hr. Zschacke.	TABANUS bouinus.
diaphana.	(Viehbreme) autumnalis.
scybalaria.	bromius.
stercoraria.	rusticus.
fimetaria.	tropicus.
graminum. Hr. Zsch.	pluvialis.
reticulata. Hr. Zsch.	caecutiens.
parietina.	lugubris.
vibrans.	RHINGIA rostrata.
cynipsea.	ASILUS crabroniformis.
grossificationis.	(Raubfliege) ater.
stylata. Hr. Zschacke.	flavus.
arenata.	gilvus.
Heraclei.	marginatus.
seminationis.	forcipatus.

36) Gehören zum neuen Genus SARGYS F. S.

ASILVS germanicus.	EMPIS livida.
teutonus.	stercorea.
cinctus.	BOMBYLIVS maior.
oelandicus. Hr. Zsch. (<i>Schwebfliege</i>)	medius.
linearis. Hr. Zsch.	minor.
CONOPS vesicularis.	minimus.
(<i>Stechfliege</i>) rufipes.	HIPPOBOSCA equina.
macrocephala. (<i>Bie-</i> (<i>Lausfliege</i>) avicularia.	
nitz.) Hr. Zsch.	Hirundinis.
flavipes.	ouina.
STOMOXYS siberita. Hr. Zschacke.	PEDICVLVS humanus.
calcitrans.	Pubis.
irritans.	Cygni.
MYOPA ferruginea.	Anseris.
(<i>Blasenfliege</i>) atra. Hr. Zschacke.	Meleagridis.
testacea.	Apis.
buccata.	ACARVS Ricinus.
CVLEX pipiens.	(<i>Milbe</i>) Reduuius.
EMPIS borealis.	lipsiensis.
(<i>Schnepfenfliege</i>) marginata. †	Vespertilionis.
pennipes.	Muscarum.
forcipata.	Gymnopteronum.
maura.	coleoptratorum.
	seminulum. (<i>Dresden</i>)
	Hr. v. Block.

I. Scarabaci.	II.	VIII.
II. Locustae.	III.	VII.
III. Hemerobii.	VII.	III.
IV. Vespae.	VI.	IV.
V. Libellulae.	VIII.	II.
VI. Scolopendrae.	XI.	XI.
VII. Araneae.	X.	X.
VIII. Cancri.	I.	IX.
IX. Papiliones.	IX. —	I.
X. Cimices.	IV.	VI.
XI. Muscae.	V.	V.

Welche von diesen Reihen würde wohl
zur besten Systematik führen?
